

配料表

脱脂乳粉, 脱盐乳清粉, 植物油 (玉米油, 菜籽油, 椰子油, 葵花籽油, 核桃油), 全脂乳粉, 乳清蛋白粉, 低聚果糖 (FOS), 乳糖, 二十二碳六烯酸粉 (DHA), 花生四烯酸粉 (ARA), 低聚半乳糖 (GOS), 核苷酸 (5'-单磷酸腺苷, 5'-胞苷酸二钠, 5'-尿苷酸二钠, 5'-鸟苷酸二钠, 5'-肌苷酸二钠), 食品添加剂: 磷脂; 维生素: 醋酸视黄酯, 胆钙化醇, dl-α-醋酸生育酚, 植物甲萘醌, 盐酸硫胺素, 核黄素, 盐酸吡哆醇, 氰钴胺, 烟酰胺, 叶酸, D-泛酸钙, L-抗坏血酸钠, D-生物素, 氯化胆碱, 牛磺酸, 叶黄素; 矿物质: 硫酸铜, 硫酸亚铁, 硫酸锌, 碳酸钙, 碘酸钾。

营养成分表

| 营养素        | 单位      | 每100克 | 每100千焦 | 营养素           | 单位    | 每100克  | 每100千焦 |
|------------|---------|-------|--------|---------------|-------|--------|--------|
| 能量         | kJ      | 1899  | 100    | 钾             | mg    | 437    | 23     |
| 蛋白质        | g       | 17.5  | 0.9    | 铜             | μg    | 171    | 9      |
| 脂肪         | g       | 20.0  | 1.1    | 镁             | mg    | 34.2   | 1.8    |
| 亚油酸        | g       | 3.00  | 0.16   | 铁             | mg    | 5.93   | 0.31   |
| 碳水化合物      | g       | 48.9  | 2.6    | 锌             | mg    | 2.4    | 0.1    |
| <b>维生素</b> |         |       |        | 钙             | mg    | 404    | 21     |
| 维生素A       | μg RE   | 437   | 23     | 磷             | mg    | 265.9  | 14.0   |
| 维生素D       | μg      | 5.93  | 0.31   | 碘             | μg    | 34.2   | 1.8    |
| 维生素E       | mg α-TE | 3.61  | 0.19   | 氯             | mg    | 304    | 16     |
| 维生素K1      | μg      | 24    | 1      | <b>可选择性成分</b> |       |        |        |
| 维生素B1      | μg      | 266   | 14     | 胆碱            | mg    | 60.0   | 3.2    |
| 维生素B2      | μg      | 266   | 14     | 牛磺酸           | mg    | 30.0   | 1.6    |
| 维生素B6      | μg      | 266   | 14     | 二十二碳六烯酸       | %总脂肪酸 | 0.40   |        |
| 维生素B12     | μg      | 0.95  | 0.05   | 二十碳四烯酸        | %总脂肪酸 | 0.60   |        |
| 烟酸(烟酰胺)    | μg      | 2621  | 138    | 低聚半乳糖         | mg    | 360.0  | 19.0   |
| 叶酸         | μg      | 24    | 1      | 低聚果糖          | mg    | 3240.0 | 170.6  |
| 泛酸         | μg      | 1671  | 88     | 叶黄素           | μg    | 202.5  | 10.7   |
| 维生素C       | mg      | 43.7  | 2.3    | 核苷酸           | mg    | 15.0   | 0.8    |
| 生物素        | μg      | 9.5   | 0.5    |               |       |        |        |
| <b>矿物质</b> |         |       |        |               |       |        |        |
| 钠          | mg      | 133   | 7      |               |       |        |        |

产品类别及属性: 乳基较大婴儿配方奶粉 标准稀释法: 一平量匙(约4.5克)奶粉冲30毫升水



官方微信公众号

扫描二维码了解更多产品信息



# 纽贝滋培臻® 较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)



# 2

净含量: 400克  
国食注字 YP20170138

哺育用量建议表

| 婴儿月龄    | 每日喂哺次数 |         | 每次喂哺量   |         |
|---------|--------|---------|---------|---------|
|         | 奶粉(次)  | 其他辅食(次) | 温开水(毫升) | 奶粉量(平匙) |
| 第6-9个月  | 4-5    | 2-3     | 180     | 6       |
| 第9-12个月 | 4-5    | 2-3     | 180     | 6       |

冲调方法

|   |   |
|---|---|
|    | 1. 配制奶粉前洗手, 将洗净的奶瓶、奶嘴、瓶盖等奶具置于沸水中消毒5分钟, 冷却待用。      |
|    | 2. 煮开安全的饮用水并冷却至50~60°C。                           |
|  | 3. 按照《哺育用量建议表》先加入适量温水, 再使用专用量匙加入适量的奶粉。            |
|  | 4. 盖严奶瓶, 轻摇至奶粉充分溶解, 喂奶前将奶液滴在手腕上测试温度, 温度适宜饮用后立即喂奶。 |

注意事项

1. 本产品不适用于牛奶蛋白不耐受或乳糖不耐受的宝宝。
2. 请按照冲调方法准备奶瓶和奶嘴, 冲调时请使用专用量匙。
3. 请严格按照《哺育用量建议表》配制奶液。除非根据医嘱, 不要改变奶粉的冲调比例。
4. 不当配制和使用可能严重影响您宝宝的健康。
5. 请于保质期前使用本产品。
6. 在此期间如需逐渐添加蔬菜、肉、鱼、蛋及水果, 应听取医生的建议。

重要说明

重要声明: 对于0~6月的婴儿最理想的食物是母乳; 6个月龄以上婴儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品。

温馨提示

1. 喂奶时应抱着宝宝, 避免宝宝哽噎。
2. 每次喂哺都应使用新配制的奶液, 如有剩余请丢弃勿再食用。

贮存条件

1. 避免强光直射, 置于阴凉干燥处保存。
2. 开封后产品请注意密封保存, 请尽量在开封后四周内食用完, 请勿放入冰箱内保存。

纽贝滋咨询热线:  
400-820-6087

想了解更多产品信息及资料请查询:  
[www.newbaze.com](http://www.newbaze.com)

- 生产商: 上海纽贝滋营养乳品有限公司
- 地址: 上海市松江区新浜镇工业园区北区北路502号
- 联系电话: 021-67763071
- 产地: 上海市

- 食品生产许可证编号: SC12931011702395
- 产品执行标准号: Q/SNBZ00025
- 生产日期(年/月/日): 见罐底
- 保质期: 24个月

6931234962328