

配料表

脱脂乳粉, 脱盐乳清粉, 植物油 (玉米油, 大豆油, 菜籽油, 椰子油, 葵花籽油, 核桃油), 全脂乳粉, 乳糖, 乳清蛋白粉, 低聚果糖 (FOS), 二十二碳六烯酸粉 (DHA), 花生四烯酸粉 (ARA), 低聚半乳糖 (GOS), 核苷酸 (5'-单磷酸腺苷, 5'-胞苷酸二钠, 5'-尿苷酸二钠, 5'-鸟苷酸二钠, 5'-肌苷酸二钠), 食品添加剂: 磷脂; 维生素: 醋酸视黄酯, 胆钙化醇, dl-α-醋酸生育酚, 植物甲萘醌, 盐酸硫胺素, 核黄素, 盐酸吡哆醇, 氰钴胺, 烟酰胺, 叶酸, D-泛酸钙, L-抗坏血酸钠, D-生物素, 氯化胆碱, 牛磺酸, 叶黄素; 矿物质: 硫酸铜, 硫酸亚铁, 硫酸锌, 碳酸钙, 碘酸钾。

营养成分表

营养素	单位	每100克	每100千焦	营养素	单位	每100克	每100千焦
能量	kJ	1919	100	钾	mg	441	23
蛋白质	g	16.5	0.9	铜	μg	173	9
脂肪	g	21.0	1.1	镁	mg	36.5	1.9
亚油酸	g	3.00	0.16	铁	mg	6.00	0.31
碳水化合物	g	48.9	2.5	锌	mg	2.4	0.1
维生素				钙	mg	441	23
维生素 A	μg RE	441	23	磷	mg	294.2	15.3
维生素 D	μg	6.00	0.31	碘	μg	36.5	1.9
维生素 E	mg α-TE	3.84	0.20	氯	mg	307	16
维生素 K1	μg	26	1	可选择性成分			
维生素 B1	μg	288	15	胆碱	mg	60.0	3.1
维生素 B2	μg	288	15	牛磺酸	mg	30.0	1.6
维生素 B6	μg	288	15	二十二碳六烯酸	%总脂肪酸	0.38	
维生素 B12	μg	1.02	0.05	二十碳四烯酸	%总脂肪酸	0.57	
烟酸 (烟酰胺)	μg	2821	147	低聚半乳糖	mg	360.0	18.8
叶酸	μg	26	1	低聚果糖	mg	3240.0	168.8
泛酸	μg	1791	93	叶黄素	μg	202.5	10.6
维生素 C	mg	46.1	2.4	核苷酸	mg	15.0	0.8
生物素	μg	10.2	0.5				
矿物质							
钠	mg	134	7				

产品类别及属性: 乳基幼儿配方奶粉 标准稀释法: 一平量匙 (约4.5克) 奶粉冲30毫升水



官方微信公众号

扫描二维码了解更多产品信息



纽贝滋培臻® 幼儿配方奶粉 (12-36月龄, 3段)



3

净含量: 800克
国食注字 YP20170139

哺育用量建议表

幼儿月龄	每日喂哺次数		每次喂哺量	
	奶粉(次)	其他辅食(次)	温开水(毫升)	奶粉量(平匙)
第12-36个月	3-4	3-4	180	6

冲调方法

	1. 配制奶粉前洗手, 将洗净的奶瓶、奶嘴、瓶盖等奶具置于沸水中消毒5分钟, 冷却待用。
	2. 煮开安全的饮用水并冷却至50~60°C。
	3. 按照《哺育用量建议表》先加入适量温水, 再使用专用量匙加入适量的奶粉。
	4. 盖严奶瓶, 轻摇至奶粉充分溶解, 喂奶前将奶液滴在手腕上测试温度, 温度适宜饮用后立即喂奶。

注意事项

1. 本产品不适用于牛奶蛋白不耐受或乳糖不耐受的宝宝。
2. 请按照冲调方法准备奶瓶和奶嘴, 冲调时请使用专用量匙。
3. 请严格按照《哺育用量建议表》配制奶液。除非根据医嘱, 不要改变奶粉的冲调比例。
4. 不当配制和使用可能严重影响您宝宝的健康。
5. 请于保质期前使用本产品。
6. 在此期间如需逐渐添加蔬菜、肉、鱼、蛋及水果, 应听取医生的建议。

重要说明

重要声明: 对于0~6月的婴儿最理想的食物是母乳。

温馨提示

1. 喂奶时应抱着宝宝, 避免宝宝哽噎。
2. 每次喂哺都应使用新配制的奶液, 如有剩余请丢弃勿再食用。

贮存条件

1. 避免强光直射, 置于阴凉干燥处保存。
2. 开封后产品请注意密封保存, 请尽量在开封后四周内食用完, 请勿放入冰箱内保存。

纽贝滋咨询热线:

400-820-6087

想了解更多产品信息及资料请查询:

www.newbaze.com

- 生产商: 上海纽贝滋营养乳品有限公司
- 地址: 上海市松江区新浜镇工业园区北区北路502号
- 联系电话: 021-67763071
- 产地: 上海市

- 食品生产许可证编号: SC12931011702395
- 产品执行标准号: Q/SNBZ0003S
- 生产日期 (年/月/日): 见罐底
- 保质期: 24个月

6931234962533