

附件4-1

配料

全脂乳粉，脱盐乳清粉，麦芽糊精，植物油(大豆油，葵花籽油，玉米油，棕榈油，椰子油)，脱脂乳粉，白砂糖，浓缩乳清蛋白粉，低聚半乳糖，低聚果糖，二十二碳六烯酸粉(DHA)，花生四烯酸粉(AA)，益生菌(动物双歧杆菌Bb-12，活菌数≥10⁶CFU/g奶粉)，叶黄素，核苷酸(5'-胞苷酸二钠，5'-尿苷酸二钠，5'-单磷酸腺苷，5'-肌苷酸二钠，5'-鸟苷酸二钠)，酒石酸氢胆碱，肌醇，牛磺酸，左旋肉碱硒化锌，L-抗坏血酸钠(维生素C)，醋酸视黄酯(维生素A)，胆钙化醇(维生素D₃)，dl-α-醋酸生育酚(维生素E)，植物甲萘醌(维生素K)，硝酸硫胺素(维生素B₁)，核黄素(维生素B₂)，盐酸吡哆醇(维生素B₆)，氰钴胺(维生素B₁₂)，烟酰胺，叶酸，D-泛酸钙，D-生物素，碳酸钙，硫酸亚铁，柠檬酸钠，氯化钠，氯化钾，硫酸锌，硫酸铜，硫酸锰，碘化钾，磷脂。

营养成分表

项目	单位	每100g	每100kJ
能量	KJ	1937	100
蛋白质	g	17.2	0.9
脂肪	g	18.6	1.0
亚油酸	g	1.94	0.10
碳水化合物	g	55.6	2.9
维生素			
维生素A	μg RE	446	23
维生素D	μg	6.97	0.36
维生素E	mg α-TE	3.87	0.20
维生素K ₁	μg	32	1.7
维生素B ₁	mg	484	25
维生素B ₂	mg	736	38
维生素B ₆	mg	368	19
维生素B ₁₂	mg	1.16	0.06
烟酸	mg	3293	170
叶酸	mg	77	4
泛酸	mg	2712	140
维生素C	mg	50.4	2.6
矿物质			
钠	mg	136	7
钾	mg	446	23
镁	mg	291	15
钙	mg	42.6	2.2
锌	mg	6.20	0.32
磷	mg	3.9	0.2
碘	mg	542	28
溴	mg	339.0	17.5
可选择性成分			
胆碱	mg	73.6	3.8
锰	mg	34.87	1.80
肌醇	mg	27.1	1.4
牛磺酸	mg	20	1
左旋肉碱	mg	9.7	0.5
二十二碳六烯酸	%总脂肪酸	0.07	0.07
二十碳四烯酸	%总脂肪酸	0.08	0.08
低聚半乳糖	mg	900.0	46.5
低聚果糖	mg	400.0	20.7
叶黄素	μg	174.3	9.0
核苷酸	mg	22.28	1.15

• 14.0克奶粉+90毫升水≈100毫升奶液，即食状态下所含的能量约为271kJ/100mL。

Hikid 聪尔壮

安宝素™ 幼儿配方奶粉 12-36月龄 3段

3 国食注字YP20170065 净含量：200g

冲调方法

- 1 喂哺前洗净双手。
- 2 将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及其它器具放入清水中煮沸至少5分钟。
- 3 冲调用水应煮沸，待冷却至约50°C备用。
- 4 将正确份量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。

喂哺表

月 龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数
	温开水量(毫升)	专用量匙	
12~36个月	200	4	3~4

喂哺表是依据宝宝的平均需求量制定。冲调时，请使用晨冠专用量匙，1平匙奶粉(约7.8克)兑50毫升水。

冲调及喂哺说明

- 为了保持益生菌的活性，冲调用水应冷却至约50°C加入奶粉。
- 每次只调制一次食用量的奶液并立即饮用，不要留存未喝完奶液。
- 勿使用沾水的量匙量取奶粉。
- 请沿边缘小心切开或撕开铝箔，防止碎片掉入罐中。

注意事项

- 请遵照冲调方法和喂哺表喂养。
- 不恰当的奶液浓度无法满足宝宝所需营养，除非有专业人员或医生建议。

贮存条件

不恰当的贮藏方法会影响奶粉的品质。请置于阴凉干燥处，勿置冰箱内。请在保质期内食用。

CHG晨冠 Hikid 聪尔壮

产地：中国上海市
生产商：上海晨冠乳业有限公司
地址：上海市奉贤区望园路2166号
电话：021-37511111
传真：021-37511166
检验合格证号：见批号
产品标准代号：GB10767
生产日期及保质期至：见罐底
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
食品生产许可证编号：SC10531012000433

6 9330833798772

扫描二维码，关注聪尔壮官方微信号，了解更多产品信息。